



ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА



Клещевой энцефалит – опасная вирусная инфекция, поражающая нервную систему. Проявления клещевого энцефалита могут быть различными: от лихорадки до менингита (воспаление оболочек мозга), энцефалита (воспаление головного мозга) и полирадикулоневрита (поражение периферических нервов и корешков).

Клещевой энцефалит может привести к стойким неврологическим осложнениям и даже к смерти, независимо от возраста заболевшего.

Архангельская область – территория, на которой часто регистрируются случаи заболевания клещевым энцефалитом. Показатели заболеваемости в нашем регионе выше, чем по Российской Федерации в целом. По информации Управления Роспотребнадзора по Архангельской области, в период с января по август 2014 года 7038 человек (среди них 1217 детей) обратились за медицинской помощью в связи с укусами клещей. За тот же период было выявлено 60 случаев заболевания клещевым энцефалитом.

ЧТО НУЖНО СКАЗАТЬ ВРАЧУ ДО ПРИВИВКИ

1. Как чувствует себя ваш ребёнок сегодня, повышалась ли у него температура, болел ли он в течение месяца до этого.
2. Были ли ранее у вашего ребёнка судороги или аллергические реакции на антибиотики, другие лекарства или продукты.
3. Отмечались ли у вашего ребёнка реакции на предыдущее введение вакцин.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ

1. Ребенку нужно измерить температуру согласно рекомендации медицинского персонала.
2. Режим ребенка менять не нужно, так как состояние ребенка после прививки обычно не изменяется.
3. Если повысилась температура или появились какие-то жалобы, от купания и прогулок следует воздержаться и обратиться к врачу.
4. После введения вакцины в месте введения может появиться уплотнение. Это не опасно и должно пройти через несколько дней. Если уплотнение держится более 3 дней или появились покраснение и отек, обратитесь к врачу.

КОГДА НУЖНО ПОДОЖДАТЬ С ПРИВИВКОЙ

Чтобы правильно реагировать на прививку, выработать необходимое количество антител и сформировать иммунитет, ребенок на момент вакцинации должен быть здоров. Прививки нельзя делать, если ребенок болен каким-либо острым заболеванием, когда у него есть насморк, кашель, диарея, температура, болит живот или голова.

Перенесенные инфекционные заболевания (менингит, вирусный гепатит, инфекционный мононуклеоз, грипп и другие) на некоторое время ослабляют защитные силы организма, что является противопоказанием к прививкам на определенный срок (чаще от 2 недель до 1 месяца после выздоровления). Поэтому посоветуйтесь с врачом Вашего ребенка о планировании вакцинации.

